



Infectious Disease *Enfermedad Infecciosa*

Feline Panleukopenia - Panleucopenia Felina

Your pet(s) may have been exposed to the feline panleukopenia virus.

Su mascota(s) puede haber estado expuesta al virus de la panleucopenia felina.

What is panleukopenia? - ¿Qué es la panleucopenia?

Panleukopenia is a disease caused by a highly contagious virus. Unvaccinated cats, younger cats (< two years), sick cats, and elderly cats are at a higher risk of becoming infected. The virus can be spread between cats through contact with urine, stool, and nasal secretions. The virus can also be spread between cats via contact with contaminated objects (blankets, bedding, toys, etc.), people (hands, clothes, shoes, etc.), and other pets (fur, paws).

La panleucopenia es una enfermedad causada por un virus altamente contagiosa. Gatos no vacunados, gatos jóvenes (<2 años), los gatos enfermos y los gatos ancianos corren mayor riesgo de infectarse. El virus puede propagarse entre gatos a través del contacto con orina, heces y secreciones nasales. El virus también puede propagarse entre gatos por contacto con objetos contaminados (cobijas, ropa de cama, juguetes, etc.), personas (manos, ropa, zapatos, etc.) y otras mascotas (piel, patas).

What should you do? - ¿Qué debes hacer?

Denver Animal Protection strongly recommends that you follow up with your regular veterinarian.

Denver Animal Protection recomienda que realice un seguimiento con su veterinario regular.

Please watch your pet(s) for the following symptoms, as they may be signs of infection:

Por favor, observe a su(s) mascota(s) por los siguientes síntomas, ya que pueden ser signos de infección:

- Vomiting - Vómitos
- Diarrhea (sometimes bloody) - Diarrea (a veces sangrienta)
- Lack of appetite - Falta de apetito
- Lethargy (inactivity, weakness) - Letargo (inactividad, debilidad)

If you note any of these signs or have concerns, seek veterinary attention immediately.

Si observa cualquiera de estos signos o tiene preocupaciones, busque atención veterinaria inmediatamente.

Because it is so contagious, cats that were potentially exposed to this virus should be kept separately from other cats at home in an easily cleaned area for 14 days.

Debido a que es tan contagiosa, los gatos potencialmente expuestos a este virus deben mantenerse separados de otros gatos en el hogar en un área de fácil limpieza durante 14 días.

Canine Parvovirus - Parvovirus canino

Your pet(s) may have been exposed to canine parvovirus.
Su mascota(s) puede haber estado expuesta al parvovirus canino

What is parvovirus? - ¿Qué es parvovirus?

Parvovirus is a disease caused by a highly contagious virus. Unvaccinated dogs, younger dogs (< two years), sick dogs, and elderly dogs are at a higher risk of becoming infected. The virus can be spread between dogs through contact with urine, stool, and nasal secretions. The virus can also be spread between dogs via contact with contaminated objects (blankets, bedding, toys, etc.), people (hands, clothes, shoes, etc.), and other pets (fur, paws).

El parvovirus es una enfermedad causada por un virus altamente contagiosa. Perros no vacunados, perros jóvenes (< 2 años), los perros enfermos y los perros ancianos corren mayor riesgo de infectarse. El virus puede propagarse entre perros a través del contacto con orina, heces y secreciones nasales. El virus también puede propagarse entre perros por contacto con objetos contaminados (cobijas, ropa de cama, juguetes, etc.), personas (manos, ropa, zapatos, etc.) y otras mascotas (piel, patas).

What should you do? - ¿Qué debes hacer?

Denver Animal Protection strongly recommends that you follow up with your regular veterinarian.

Denver Animal Protection recomienda que realice un seguimiento con su veterinario regular.

Please watch your pet(s) for the following symptoms, as they may be signs of infection:

Por favor, observe a su(s) mascota(s) por los siguientes síntomas, ya que pueden ser signos de infección:

- Vomiting - Vómitos
- Diarrhea (sometimes bloody) - Diarrea (a veces sangrienta)
- Lack of appetite - Falta de apetito
- Lethargy (inactivity, weakness) - Letargo (inactividad, debilidad)

If you note any of these signs or have concerns, seek veterinary attention immediately.

Si observa cualquiera de estos signos o tiene preocupaciones, busque atención veterinaria inmediatamente.

Because it is so contagious, dogs that were potentially exposed to this virus should be kept separately from other dogs at home in an easily cleaned area for 14 days.

Debido a que es tan contagiosa, los perros potencialmente expuestos a este virus deben mantenerse separados de otros perros en el hogar en un área de fácil limpieza durante 14 días.

Canine Distemper Virus - Virus del moquillo canino

Your pet(s) may have been exposed to canine distemper virus.

Su mascota(s) puede haber estado expuesta al virus del moquillo canino

What is distemper? - ¿Qué es el moquillo?

Distemper is a disease caused by a highly contagious virus. Unvaccinated dogs, younger dogs (< two years), sick dogs, and elderly dogs are at a higher risk of becoming infected. The virus can be spread between dogs through contact with urine, stool, and nasal secretions. The virus can also be spread between dogs via contact with contaminated objects (blankets, bedding, toys, etc.), people (hands, clothes, shoes, etc.), and other pets (fur, paws).

El moquillo es una enfermedad causada por un virus altamente contagiosa. Perros no vacunados, perros jóvenes (<2 años), los perros enfermos y los perros ancianos corren mayor riesgo de infectarse. El virus puede propagarse entre perros a través del contacto con orina, heces y secreciones nasales. El virus también puede propagarse entre perros por contacto con objetos contaminados (cobijas, ropa de cama, juguetes, etc.), personas (manos, ropa, zapatos, etc.) y otras mascotas (piel, patas).

What should you do? - ¿Qué debes hacer?

Denver Animal Protection strongly recommends that you follow up with your regular veterinarian.

Denver Animal Protection recomienda que realice un seguimiento con su veterinario regular.

Please watch your pet(s) for the following symptoms, as they may be signs of infection:

Por favor, observe a su(s) mascota(s) por los siguientes síntomas, ya que pueden ser signos de infección:

- Watery to pus-like discharge from eyes - Descarga acuoso, como pus, de los ojos
- Nasal discharge - Secreción nasal
- Coughing - Tos
- Vomiting - Vómitos
- Diarrhea - Diarrea
- Lack of appetite - Falta de apetito
- Circling behavior, head tilt, muscle twitches, seizures - Da vueltas en circulo, inclinación de cabeza, contracciones musculares, convulsiones.

If you note any of these signs or have concerns, seek veterinary attention immediately. With this virus, symptoms may take up to six weeks to develop. Ideally, exposed dogs should be kept in an easily cleaned area separately from other susceptible dogs for that time.

Si observa cualquiera de estos signos o tiene preocupaciones, busque atención veterinaria inmediatamente. Con este virus, las síntomas pueden tardar hasta 6 semanas en desarrollarse. Idealmente, los perros potencialmente expuestos a este virus deben mantenerse separados de otros perros en el hogar y en un área de fácil limpieza durante 14 días.

Canine Influenza Virus - Virus de la Influenza Canina

Your pet(s) may have been exposed to canine influenza virus.

Su mascota(s) puede haber estado expuesta al virus de la gripe canina.

What is influenza? - ¿Qué es la influenza?

Influenza is a disease caused by a highly contagious virus. Dogs of all ages are at risk for becoming infected. The virus can be spread between dogs through contact with nasal secretions (nose-nose, sneezing, coughing). The virus can also be spread between dogs via contact with contaminated objects (blankets, bedding, toys, etc.), people (hands, clothes, shoes, etc.), and other pets (fur, paws).

La influenza es una enfermedad causada por un virus altamente contagiosa. Los perros de todas las edades están en riesgo de infectarse. El virus puede propagarse entre los perros a través del contacto con las secreciones nasals (Nariz-nariz, estornudos, tos). El virus también puede propagarse entre perros por contacto con objetos contaminados (cobijas, ropa de cama, juguetes, etc.), personas (manos, ropa, zapatos, etc.) y otras mascotas (piel, patas).

What should you do? - ¿Qué debes hacer?

Denver Animal Protection strongly recommends that you follow up with your regular veterinarian.

Denver Animal Protection recomienda que realice un seguimiento con su veterinario regular.

Please watch your pet(s) for the following symptoms, as they may be signs of infection:

Por favor, observe a su(s) mascota(s) por los siguientes síntomas, ya que pueden ser signos de infección:

- Nasal discharge - Secreción nasal
- Coughing - Tos
- Lack of appetite - Falta de apetito
- Lethargy (inactivity, weakness) - Letargo (inactividad, debilidad)

If you note any of these signs or have concerns, seek veterinary attention immediately.

Si observa cualquiera de estos signos o tiene preocupaciones, busque atención veterinaria inmediatamente.

Because it is so contagious, dogs that were potentially exposed to this virus should be kept separately from other dogs at home in an easily cleaned area for 14 days

Debido a que es tan contagiosa, los perros potencialmente expuestos a este virus deben mantenerse separados de otros perros en el hogar en un área de fácil limpieza durante 14 días.

Ringworm - Tiña

Your pet(s) may have been exposed to ringworm.

Su mascota(s) puede haber estado expuesta a la tiña.

What is ringworm? - ¿Qué es la tiña?

Ringworm is caused by a fungus that infects the skin, hair, or nails. Ringworm is highly contagious and can be spread between dogs, cats, and people through direct contact (touching, petting, playing). Ringworm can also be spread by contact with contaminated objects (blankets, bedding, toys, etc.), areas (carpets, floors, surface), people (hands, clothes, shoes, etc.), and other pets (fur, paws).

La tiña es causada por un hongo que infecta la piel, pelo o uñas. La tiña es altamente contagiosa y puede propagarse entre perros, gatos y personas a través del contacto directo (tocar, acariciar, jugar). La tiña también puede propagarse por contacto con objetos contaminados (cobijas, ropa de cama, juguetes, etc.), áreas (alfombras, pisos, superficie), personas (manos, ropa, zapatos, etc.) y otras mascotas (piel, patas).

Ringworm is contagious to humans.

La tiña es contagiosa para los seres humanos.

What should you do? - ¿Qué debes hacer?

Denver Animal Protection strongly recommends that you follow up with your regular veterinarian.

Denver Animal Protection recomienda que realice un seguimiento con su veterinario regular.

Please watch your pet(s) for the following symptoms, as they may be signs of infection:

Por favor, observe a su(s) mascota(s) por los siguientes síntomas, ya que pueden ser signos de infección:

- Itchiness - Picazón
- Hair loss - Pérdida de pelo
- Crusting and scaling on the skin - Costras, descamación en la piel

If you note any of these signs or have concerns, seek veterinary attention immediately. If you note any of these signs on yourself or a family member, seek medical care from your physician.

Si observa cualquiera de estos signos o tiene preocupaciones, busque atención veterinaria inmediatamente. Si nota alguno de estos signos en usted o en un miembro de su familia, busque atención médica de su médico.