




## Dental Post-Operative Care Instructions

- Your new pet has had a dental cleaning and oral surgery to extract diseased teeth. S/he has gum incisions held together with dissolvable sutures.
- You must feed your pet canned food **only** for 10 days after the dental procedure. **No treats, toys, or anything hard to chew on**, as this may cause the sutures to break and the gum incisions to come apart. If this happens, please follow up with your regular veterinarian.
- If your pet is wearing an e-collar, s/he must wear it at all times for 7–10 days after the procedure. This prevents the pet from using his/her paws to scratch at and break the sutures. If this happens, please follow up with your regular veterinarian.
- There may be a small amount of blood coming from the mouth or nose. This is normal and should only last 1–2 days.
- Your pet may have had a long-acting antibiotic given by injection.
- If your pet is excessively lethargic, stops eating, has persistent bleeding or swelling around the mouth area, open gum incisions, or a foul odor from the mouth, please follow up with your regular veterinarian.





## INSTRUCCIONES DE CUIDADO POSTOPERATORIO DENTAL

- Su nueva mascota ha tenido una limpieza dental y cirugía oral para extraer los dientes enfermos. Él / ella tiene incisiones en las encías unidas con sutura soluble.
- Debe alimentar a su mascota con alimentos enlatados solamente durante 10 días después del procedimiento dental. **No hay snacks, juguetes o cualquier cosa difícil de masticar**, ya que esto puede hacer que las suturas se rompan y que las incisiones de las encías se separen. Si esto sucede, deberá realizar una cita con su veterinario habitual.
- Si su mascota lleva un cono médico, debe usarlo en todo momento durante 7-10 días después del procedimiento. Esto evita que la mascota use sus patas para rascarse y romper las suturas. Si esto sucede, tendrá que hacer una cita con su veterinario habitual.
- Puede haber una pequeña cantidad de sangre que sale de la boca o la nariz. Esto es normal y solo debe durar 1-2 días.
- Es posible que su mascota haya recibido un antibiótico de acción prolongada mediante inyección.
- Si su mascota está excesivamente letárgica, deja de comer, tiene sangrado persistente o hinchazón alrededor del área de la boca, tiene incisiones abiertas en las encías o tiene un olor fétido de la boca, consulte a su veterinario habitual.

