



Cuidados Post-Operatorios

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

- Su mascota ha tenido una cirugía mayor con anestesia general, lo que significa que estuvo inconsciente durante la operación.
- En perras y gatas, el útero y ovarios se eliminan a través de una pequeña incisión en la pared abdominal.
- En perros y gatos, el escroto no se elimina, sólo los testículos. A los perros se les hace una incisión apenas por arriba del escroto. A los gatos se les hacen dos incisiones, una a cada lado del escroto. Los gatos pueden aparentar seguir teniendo testículos. Esto es normal, la hinchazón debe bajar gradualmente durante el lapso de recuperación.

TATUAJE

- A todas las gatas, perras y a todos los perros machos se les aplica un pequeño tatuaje verde en el lugar de la incisión.

SUTURAS

- A menos que se indique lo contrario, su mascota no tiene suturas externas.
- Los gatos machos no tienen ninguna sutura.
- Todas las suturas son asimilables por adentro. La capa más externa de piel se mantiene unida con adhesivo quirúrgico.

LO QUE DEBE ESPERAR AL LLEVAR SU MASCOTA A CASA

- Le hacemos hincapié en la recomendación de mantener su mascota confinada en una jaula o espacio pequeño durante la noche posterior a la cirugía.
- Su mascota puede estar aletargada al llegar a casa, experimentando una "resaca" de la anestesia. Su mascota necesitará por lo general de 18-24 horas para recuperarse de la anestesia general. La mayoría de los animales volverán a la normalidad cuando la anestesia salga por completo de su organismo.
- Su mascota puede dormir mucho más de lo normal durante las 18-24 posteriores a la cirugía.
- Su mascota podría presentar pérdida de equilibrio. Esto hará que subir escaleras o que subirse o bajarse del auto sea más difícil de lo normal, así que prepárese a ayudarlo. Ayude a que su perro suba y baje del auto ya que los movimientos bruscos pueden romper las puntadas. Levante al perro, envolviendo sus brazos alrededor del pecho/ piernas delanteras del perro y de la parte posterior/ patas traseras.
- Asegúrese de que su gato tenga una ubicación cómoda para que duerma en un lugar seguro, tranquilo y aislado. Una vez que quede instalado, lo más probable es que concilie el sueño y esté en buenas condiciones al despertar.

LUGAR DE LA INCISIÓN (CICATRIZ)

- Lo que usted nota el día de la cirugía es normal. No debe haber ningún flujo. Se pueden presentar enrojecimiento o hinchazón leve en el sitio de la incisión.
- No permita que su mascota lama ni muerda la cicatriz. Esto podría provocar que la herida vuelva a abrirse y se infecte. Le recomendamos colocarle un cuello isabelino si su mascota lame o muerde la cicatriz. El cuello debe usarse durante todo el lapso de recuperación, que es de 10-14 días.

- No se le debe bañar durante 10-14 días.
- Haga que su veterinario revise la cicatriz en 10-14 días.

ACTIVIDAD

- El proceso de cicatrización tarda 7-10 días.
- Limite por favor la actividad de su mascota durante los siguientes 7-10 días. No debe correr, saltar, jugar ni llevar a cabo ninguna otra actividad extenuante.
- Las mascotas deben ser mantenidas en interiores durante el lapso de recuperación. Donde puedan mantenerse limpias y secas.
- En exteriores, los perros deben ser llevados con correa y en caminatas cortas durante los siguientes 10 días.

ALIMENTACIÓN POST-OPERATORIA

- La anestesia tiende a provocar náuseas en los animales, por lo que su mascota podría no tener apetito al llegar a casa después de la cirugía.
- Sirva pequeñas raciones de comida y agua cuando su mascota haya despertado por completo. En caso de vómito, no le ofrezca comida hasta el día siguiente. Le puede dar su ración habitual de comida y agua al día siguiente de la cirugía.
- No cambie la dieta de su mascota durante la recuperación. No le dé sobras, leche, ni cualquier otro alimento para consumo humano.
- Esto podría ocultar posibles complicaciones post-operatorias.
- El apetito de su mascota debe volver a la normalidad en un lapso de 24 horas después de la cirugía.

POSIBLES COMPLICACIONES

La esterilización y castración son cirugías muy seguras. Sin embargo, pueden surgir complicaciones. El enrojecimiento e hinchazón leves deben desaparecer en pocos días. Si la hinchazón persiste o si usted nota cualquiera de los siguientes síntomas, por favor comuníquese de inmediato con su veterinario regular.

- Encías pálidas
- Vómito
- Diarrea
- Letargo
- Flujos o sangrado en la cicatriz
- Dificultad para orinar

ALGUNOS VETERINARIOS DE EMERGENCIA A LOS CUALES ACUDIR:

Alameda East Veterinary Hospital - 9770 E Alameda Ave. 303-309-8947

Animal Critical Care - 1597 Wadsworth Blvd. 303-239-1200

Central Veterinary Referral (VRCC) - 3550 S. Jason St. 303-874-7387

Northside Emergency - 945 W. 124th Ave. 303-252-7722