



What to Expect After Your Pet's Vaccinations

It is common for pets to experience some or all of the following mild side effects after receiving a vaccine, usually starting within hours of the vaccination. If these side effects last for more than a day or two, or cause your pet significant discomfort, it is important for you to contact your veterinarian:

- Discomfort and local swelling at the vaccination site
- Mild fever
- Decreased appetite and activity
- Sneezing, mild coughing, “snotty nose” or other respiratory signs may occur 2–5 days after your pet receives an intranasal vaccine

More serious, but less common side effects, such as allergic reactions, may occur within minutes to hours after vaccination. These reactions can be life-threatening and are considered medical emergencies.

Seek veterinary care immediately if your pet develops any of the following:

- Persistent vomiting or diarrhea
- Itchy skin that may seem bumpy (“hives”)
- Swelling of the muzzle and around the face, neck, or eyes
- Severe coughing or difficulty breathing
- Collapse

A small, firm swelling under the skin may develop at the site of a recent vaccination. It should start to disappear within a couple weeks. If it persists more than three weeks, or seems to be getting larger, you should contact your veterinarian.

Always inform your veterinarian if your pet has had prior reactions to any vaccine or medication. If you have concerns, wait for 30-60 minutes following vaccination before taking your pet home from the veterinarian.



Lo que debe esperar después de vacunar a su mascota



Es frecuente que los animales experimenten algunos o todos los siguientes efectos secundarios de manera leve después de ser vacunados, que suelen comenzar a las pocas horas de la vacunación. Si estos efectos secundarios duran más de un día o dos, o causan un malestar significativo en su mascota, es importante que usted se comunique con su veterinario:

- Malestar e hinchazón en el lugar de la vacunación
- Fiebre ligera
- Desánimo y pérdida de apetito
- Estornudos, tos leve, "nariz mucosa" o demás síntomas respiratorios que se pueden presentar 2-5 días después de aplicarse una vacuna vía nasal a su mascota

Efectos secundarios más graves, aunque menos comunes, tales como reacciones alérgicas, pueden ocurrir en cuestión de minutos o en las horas posteriores a la vacunación. Estas reacciones pueden resultar mortales y son emergencias médicas.

Busque de inmediato atención veterinaria si se presentan cualquiera de estos síntomas:

- Vómito o diarrea persistentes
- Hinchazón cutánea con apariencia irregular ("ronchas")
- Hinchazón en el hocico y a lo largo de la cara, cuello y ojos
- Toz aguda o dificultades para respirar
- Desmayo

Podría desarrollarse una hinchazón pequeña y definida en el área de una vacunación reciente, que comenzará a desaparecer en un par de semanas. Si persiste durante tres o más semanas, o si aparenta aumentar, consulte a su veterinario.

Avise a su veterinario si su mascota ha tenido previamente reacciones a cualquier vacuna o medicamento. En caso de duda, espere 30-60 minutos después de la vacunación antes de llevar a su mascota a casa.